



Брошюра по препаратам вальпроевой кислоты для пациентов, способных стать отцом ребёнка

Прочтите эту брошюру,
а также листок-вкладыш
для пациентов
и инструкцию к препарату
для получения полной
информации

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

Эта брошюра содержит важную информацию о потенциальном риске для детей, зачатых в период лечения их отца препаратами вальпроевой кислоты.
Если у вас появятся вопросы, обсудите их с лечащим врачом.

**СОХРАНИТЕ ЭТУ БРОШЮРУ.
ВОЗМОЖНО, ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЧИТАТЬ ЕЁ.**

Каковы риски при приёме препарата вальпроевой кислоты при зачатии ребёнка

По данным исследования предполагается, что у детей, рождённых от отцов, которые принимали препарат вальпроевой кислоты в течение 3 месяцев до зачатия, возможен риск нарушений двигательного и умственного развития (проблемы развития в раннем детском возрасте).

В данном исследовании примерно 5 детей из 100 рождённых имели такие нарушения, если их отцы получали препарат вальпроевой кислоты, в сравнении с примерно 3 детьми из 100, если их отцы получали лечение ламотриджином и леветирацетамом (другими препаратами, которые могут использоваться для лечения вашего заболевания).

Риск для детей, рождённых от отцов, которые прекратили лечение препаратом вальпроевой кислоты за 3 месяца (время, необходимое для образования новых сперматозоидов) или более до зачатия, неизвестен.

-
-
-
-
-

Что это означает для меня?

Ваш врач обсудит с вами (и/или вашими родителями/опекунами) потенциальный риск для детей, рождённых от отцов, получавших препарат вальпроевой кислоты, и необходимые меры предосторожности во время лечения препаратами вальпроевой кислоты:

- необходимость использования **эффективной контрацепции** (методов предупреждения беременности) для вас и вашей партнёрши во время лечения препаратом вальпроевой кислоты и в течение 3 месяцев после прекращения его приёма;
- необходимость консультации врача, чтобы **обсудить альтернативные методы лечения**, как только вы запланируете зачатие ребёнка и до прекращения использования контрацепции;
- **не становитесь донором спермы** во время приёма препарата вальпроевой кислоты и в течение 3 месяцев после прекращения лечения этим препаратом.

Если ваша партнёрша забеременела в то время, когда вы принимали препарат вальпроевой кислоты (за 3 месяца до зачатия), вам обоим следует обратиться к врачу для получения консультации.

Не прекращайте лечение, не посоветовавшись с врачом. Если вы прекратите лечение, симптомы вашего заболевания могут ухудшиться.

Вам следует **регулярно (не реже одного раза в год)** посещать лечащего врача.

В начале лечения и в ходе ежегодных визитов врач ознакомит вас с Ежегодно заполняемой формой информированного согласия о рисках, чтобы убедиться, что вы понимаете риски и осознаёте необходимые меры предосторожности, связанные с применением препарата вальпроевой кислоты.



АО «Санофи Россия»
125375, Москва, ул. Тверская, д.22
+7 495 721 14 00

Информацию о применении препарата вальпроевой кислоты у мужчин можно найти на сайте <https://epilepsyinfo.ru>

VV-PV-0555465