



РУКОВОДСТВО ПО ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЕ* ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МУЖСКОГО ПОЛА, СПОСОБНЫХ К ЗАЧАТИЮ

*Прочтите данное
руководство вместе с
инструкцией по медицинскому
применению (листочком-
вкладышем) для пациентов
для ознакомления с полной
информацией о препарате*

ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА: ЧТО ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

Данное руководство содержит информацию о потенциальном риске для мужчин, способных к зачатию, в случае получения лечения вальпроевой кислотой.

При возникновении каких-либо вопросов обратитесь за консультацией к своему врачу.

**СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ЦЕЛЯХ
ПОВТОРНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЕГО СОДЕРЖАНИЕМ В
СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ**



* Вальпроевая кислота, также известная как Вальпроат, Депакин Хроно, Депакин Хроносфера, Энкорат, Энкорат Хроно. Энкорат Хроно 200, Энкорат Хроно 300, Энкорат Хроно 500

Риски приема вальпроевой кислоты* для мужчин при зачатии

Исследование показывает, что в случае приема вальпроевой кислоты в период 3 месяца до зачатия, для ребенка существует повышенный риск нарушений умственного и/или моторного развития по сравнению с детьми, рожденными от отцов, принимавших ламотриджин или леветирацетам, другие лекарственные препараты, которые могут быть использованы для лечения Вашего заболевания.

В данном исследовании указанные нарушения были выявлены примерно у 5 из 100 детей, рожденных от отцов, принимавших вальпроевую кислоту, и примерно у 3 из 100 детей, рожденных от отцов, принимавших другие лекарственные препараты.

Данные о потенциальном риске для детей, рожденных от отцов, прекративших прием вальпроевой кислоты более чем за 3 месяца до зачатия (время, необходимое для образования новой спермы), отсутствуют.

Что это значит для меня?

Врач проконсультирует Вас (и/или Ваших родителей / опекуна) о потенциальном риске для вашего будущего ребенка в случае получения Вами лечения вальпроевой кислотой, а также о мерах предосторожности, связанных с ее применением:

- о необходимости использования **эффективных средств контрацепции** (противозачаточных средств) для Вас и Вашей партнерши во время лечения и в течение 3 месяцев после прекращения приема вальпроевой кислоты;
- о необходимости обращения за консультацией к врачу **для обсуждения альтернативных вариантов лечения** в случае планирования беременности и перед прекращением использования средств контрацепции (противозачаточных средств);
- **о запрете сдавать сперму** во время лечения и в течение 3 месяцев после прекращения лечения.

Если Ваша **партнерша забеременела** в период получения Вами лечения вальпроевой кислотой в период 3 месяцев до зачатия, вам обоим следует **обратиться к врачу за консультацией**.

Не прекращайте лечение без консультации с врачом. При прекращении лечения симптомы Вашего заболевания могут ухудшиться.

Вам следует **регулярно (по крайней мере, ежегодно) посещать своего врача**. В начале лечения и во время ежегодных посещений Ваш врач предоставит Вам на ознакомление и подписание форму ежегодного ознакомления с риском, чтобы удостовериться в Вашем понимании существующего риска и мер предосторожности, связанных с применением вальпроевой кислоты.



* Вальпроевая кислота также известна как Вальпроат, Депакин Хроно, Депакин Хроносфера, Энкорат, Энкорат Хроно. Энкорат Хроно 200, Энкорат Хроно 300, Энкорат Хроно 500

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА